

سفالکسین

راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو مخصوصا در موارد زیر، با پزشک مشورت کنید:

- در صورت داشتن حساسیت به داروهای گروه پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها (مثل آموکسی‌سیلین، سفیکسیم، ...) و داروهای دیگر و یا حساسیت به مواد غذایی، رنگ‌ها و محافظ‌ها.
- در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی و کبدی، بیماریهای گوارشی مانند زخم و التهاب معده، زخم اثنی‌عشر، کولیت و یا مشکلات خونی.
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف همزمان با هر نوع داروی دیگر.
- انجام هر نوع تست آزمایشگاهی.

هشدارها:

- برای مشاهده اثر درمانی بهتر، دارو را با فواصل زمانی منظم (همراه با غذا یا با معده خالی) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهرا بهبودی حاصل شده باشد، کامل کنید.
- کپسول سفالکسین را می‌توان با نوشیدنی‌های دیگر مانند شیر یا آب میوه میل نمود.
- در صورت بروز اسهال بعد از مصرف این دارو، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- مصرف خودسرانه سفالکسین ممکن است باعث مقاومت دارویی بدن در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می‌کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

- | | |
|--|--|
| ۲۵۰ میلی‌گرم تا ۱ گرم هر ۶ تا ۱۲ ساعت. | بالغین و نوجوانان با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم: |
| ۶/۲۵ تا ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت و یا ۱۲/۵ تا ۵۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت. | کودکان یک ساله و بزرگتر با وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم: |
| ۶/۲۵ تا ۱۲/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت. | نوزادان با سن یک ماه تا یک سال: |

روش تهیه سوسپانسیون:

ابتدا چند بار شیشه را تکان دهید تا پودر داخل آن از هم باز شود. سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد شده را در دو مرحله به پودر بیفزایید و هر بار شیشه را خوب تکان دهید. قبل از هر بار مصرف، شیشه را خوب تکان دهید و درپوش شیشه را بعد از مصرف محکم ببندید. برای مصرف سوسپانسیون، حتی المقدور از پیمانه داخل جعبه استفاده نمایید و یا از قاشقی استفاده کنید که مقدار لازم را (۵ میلی‌لیتر) به بیمار برساند.

مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده، مطابق قبل دارو را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می‌گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:
اسهال، تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، تنگی نفس، کهیر، خارش، سردرد، سرگیجه، تب، آفت و یا زخم در دهان و زبان، کرامپ معده، خارش نواحی مقعدی و تناسلی، قرمزی و تورم پوست.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- کپسول و پودر جهت تهیه سوسپانسیون سفالکسین را در دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد (ترجیحاً بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.
- سوسپانسیون تهیه شده را در یخچال نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید. باقیمانده سوسپانسیون را بعد از ۱۴ روز دور بریزید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی و اشکال دارویی:

- کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی‌گرمی در جعبه های ۱۰۰ عددی، هر کپسول حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم سفالکسین (بصورت مونو هیدرات) می‌باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر سوسپانسیون خوراکی سفالکسین ۱۲۵، هر ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۱۲۵ میلی‌گرم سفالکسین (بصورت مونو هیدرات) می‌باشد.
- پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر سوسپانسیون خوراکی سفالکسین ۲۵۰، هر ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون آماده شده حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم سفالکسین (بصورت مونو هیدرات) می‌باشد.