

# کلاویسیلین®

## کوآموکسی کلاو

### راهنمایهای علمی دارو جهت بیمار:

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

### راهنمایهای عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت داشتن حساسیت به داروهای گروه پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها (مثل آموکسی‌سیلین، سفالکسین، سفیکسیم، ...) و داروهای دیگر و یا حساسیت به مواد غذایی، رنگها و محافظها.
- در صورت داشتن رژیم غذایی کم نمک.
- در صورت ابتلا به بیماریهای قلبی، مشکلات خونی یا تاریخچه‌ای از آن، فشار خون، کیست فیبروز، بیماری کلیوی، منونوکلئوزیس، مشکلات کبدی و بیماریهای معده‌ای و رودهای.
- حاملگی و شیردهی.
- در صورت مصرف هم‌زمان با هر نوع داروی دیگر.
- انجام هر نوع تست آزمایشگاهی.

### هشدارها:

- در صورت عدم بهبود و یا بدتر شدن بیماری بعد از گذشت چند روز از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- برای مشاهده اثر درمانی بهتر، دارو را با فواصل زمانی منظم (همراه با غذا یا با معده خالی) میل کنید و دوره درمان را حتی اگر ظاهراً بهبودی حاصل شده باشد، کامل کنید.
- برای کاهش شدت اثرات جانبی احتمالی این دارو مانند اسهال، حالت تهوع و استفراغ بهتر است کو-آموکسی کلاو را همراه با غذا میل نمایید.
- در صورت بروز اسهال بعد از مصرف این دارو، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- پنی‌سیلین‌ها به مقدار بسیار ناچیزی وارد شیر مادر می‌شوند، بنابراین ممکن است واکنشهای حساسیتی مانند اسهال، عفونت‌های قارچی و حساسیت پوستی در کودک شما دیده شود.

### مقدار و نحوه مصرف دارو به شکل سوسپانسیون و ساشه:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. مقادیر مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بالغین و نوجوانان با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌گرم آموکسی‌سیلین در ترکیب با ۱۲۵ میلی‌گرم کلاولانیک اسید

هر ۸ ساعت یا ۵۰۰ تا ۸۷۵ میلی‌گرم آموکسی‌سیلین در ترکیب با ۱۲۵ میلی‌گرم کلاولانیک اسید هر ۱۲ ساعت.

نوزادان با سن کمتر از ۳ ماه:

۱۵ میلی‌گرم آموکسی‌سیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت.

نوزادان با سن بیشتر از ۳ ماه و کودکان با وزن ۶/۷ تا ۲۲/۵ میلی‌گرم آموکسی‌سیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ترکیب با

۱/۷ تا ۳/۲ میلی‌گرم کلاولانیک اسید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۸ تا ۱۲ ساعت.

### روش تهیه سوسپانسیون در شیشه ۱۰۰ میلی لیتری:

- ابتدا چند بار شیشه را تکان دهید تا پودر داخل آن از هم باز شود، سپس تا خط نشانه، آب جوشیده و سرد شده را در دو مرحله به پودر بیفزایید و هر بار شیشه را خوب تکان دهید. قبل از هر بار مصرف، شیشه را خوب تکان دهید و درپوش شیشه را بعد از مصرف محکم ببندید. سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو را حتی المقدور با استفاده از پیمانه داخل جعبه میل نمایید و یا از قاشقی استفاده کنید که مقدار لازم (۵ میلی‌لیتر) را به بیمار برساند.

## مصرف داروی فراموش شده:

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، مقدار فراموش شده را میل نمایید. چنانچه زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن آن صرف نظر کرده، مطابق قیل دارو را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو رفع می گردد، با این وجود در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

- عوارضی که در صورت بروز نیاز به قطع سریع دارو و تماس فوری با پزشک دارند: سرفه، تنفس نامنظم و سریع، تب، درد مفاصل، گیجی و منگی، خارش و ترشحات واژن، سنکوپ ناگهانی، ورم کردن صورت، قرمزی و التهاب چشم ها، تنفس کوتاه، بثورات جلدی همراه با سوزش و خارش، زخم در دهان و زبان، ایجاد نقاط سفید در دهان و زبان و خستگی و ضعف غیر معمول.
- عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند: کرامپهای شکمی همراه با درد شدید، تحریکات شکمی دردناک، تشنج، کاهش مقدار ادرار، اسهال آبکی و شدید (شاید همراه با خون)، افسردگی، تهوع و استفراغ، زخم در گلو، گلو درد و تب، خونریزی غیرعادی، زردی چشم یا پوست، قرمزی و التهاب زبان، درد سینه، ورم صورت، انگشتان و انتهای پاها و مشکل در دفع ادرار.
- عوارضی که بمرور زمان و با تطابق بدن با دارو از بین رفته و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند ولی در صورت تداوم یافتن و یا تشدید شدن نیاز به توجه پزشکی دارند: اسهال متوسط، نفخ، سردرد، معده درد، بلع مشکل، احساس سرما، خونریزی بینی و خستگی غیر معمول.
- علائمی مثل کرامپهای شکمی توام با درد و اسهال شدید و آبکی ممکن است تا چندین هفته بعد از قطع مصرف دارو نیز مشاهده شود.

## شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- پودر خشک و قرص را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری نمایید.
- سوسپانسیون تهیه شده در شیشه را در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. باقیمانده سوسپانسیون های کو-آموکسی کلاو ۴۵۷، ۲۲۸ را پس از ۱۰ روز دور بریزید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

## بسته بندی و اشکال دارویی:

- سوسپانسیون کلاویسیلین ۲۲۸ و ۴۵۷ در شیشه های ۱۲۰ میلی لیتری با خط نشانه در ۱۰۰ میلی لیتر. هر ۵ میلی لیتر سوسپانسیون آماده شده طبق دستور، به ترتیب حاوی ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین و ۲۸/۵ و ۵۷ میلی گرم کلاولانیک اسید می باشد.