

Varenicline

وارنیکلین

از روز اول تا روز سوم: ۵/۰ میلی گرم در روز
از روز چهارم تا روز هفتم: ۵/۰ میلی گرم، دو بار در روز
از روز هشتم تا پایان دوره درمان: ۱ میلی گرم، دو بار در روز
عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگر چه عمده این عوارض در یک روز دیده نمی شوند ولی در صورت بروز هر یک با پزشک خود مشورت نمایید.

تنگی نفس، اختلال تنفسی، فشار بروی قفسه سینه، خس خس سینه، دل درد، اختلال در خواب، احساس ضعف، یبوست، خشکی دهان، خستگی، نفخ، سردرد، بیخوابی، بی قراری، تهوع، بی اشتهاپی، اختلال چشایی در تشخیص مزه، خارش، آبریزش بینی، خواب آلودگی، استفراغ.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی و بیش از مقدار توصیه پزشک، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و درون جعبه نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

راهنمایی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید: وجود هرگونه حساسیت به وارنیکلین یا مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف هم زمان با هر نوع داروی دیگر به خصوص بوپروپیون یا سایر داروهای درمان ترک سیگار.

مصرف در حاملگی و شیردهی

مصرف این دارو در این دوران فقط به تشخیص پزشک معالج صورت می گیرد.

نکات قابل توصیه

- قرص را به طور کامل بلعیده و از شکستن، جویدن و یا خردکردن آن خودداری کنید.
- در صورت حاملگی یا احتمال وقوع آن فوراً پزشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. میزان مصرف معمول این دارو به شرح زیر است: